

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Maladie des racines et pourriture du Collet</p> | <p>Le champignon se conserve dans le sol.</p> | <p>Toute plante ne supportant pas un sol trop humide et mal drainée.</p> | <p>Décoloration du feuillage Chute prématurée des feuilles. Base de la plante pourrie avec souvent une odeur désagréable.</p> | <p>Sujets trop arrosés. Sol mal drainé. Terre compacte en fin d'hiver.</p> | <p>Changer la terre. Réduire les arrosages. Améliorer le drainage. Eliminer les tissus en décomposition.</p> |
| <p>Pourriture grise</p> | <p>Le <i>Botrytis cinerea</i> est un champignon qui envahit les tissus blessés, morts ou sains à le faveur d'un excès d'humidité</p> | <p>Annuelles, bisannuelles, vivaces, rosiers et bulbes (boutures et fonte des semis)</p> | <p>Pourriture sur feuilles, tiges et surtout boutons floraux (feutrage grisâtre). Les plantes noircissent et meurent en devenant un foyer infectieux. La maladie se propage.</p> | <p>Temps frais et humide. Très virulent sous abri. Traiter d'avril à septembre.</p> | <p>Supprimer les parties malades. Ne pas trop serrer les plantes. Aérer les serres. Traiter au soufre</p> |
| <p>Rouille</p> | <p>Champignon produisant des pustules qui affectent l'esthétique et affaiblissent les plantes. Les feuilles tombent. Il se conserve pendant la mauvaise saison s'il n'a pas été détruit.</p> | <p>Rose – trémière, pélarгонium, anémone, iris, mufler, aubriète chrysanthème, œillet, millepertuis, rosier</p> | <p>Pustules orangés, bruns ou noirâtres sur la face inférieure des feuilles. Parfois chute prématurée des feuilles.</p> | <p>Humidité importante et températures douces. Présence d'eau sur feuillage. Traiter de mai à fin septembre</p> | <p>Brûler les feuilles malades. Traiter avec du cuivre au tout début de la maladie</p> |